arXiv:1503.05218v1 [math.CV] 17 Mar 2015

# Степеневі ряди та ряди Лорана в алгебрі комплексних кватерніонів

**Т. С. Кузьменко**

Taylor's and Laurent's expansions of $G$-monogenic mappings taking values in the algebra of complex quaternion are obtained and singularities of these mappings are classified.

В алгебре комплексных кватернинионов получены тейлоровские и лорановские разложения $G$-моногенных отображений, классифицированы их особые точки.

**1. Вступ.** Нехай $\mathbb{H}(\mathbb{C})$ — алгебра кватерніонів над полем комплексних чисел $\mathbb{C}$, базис якої складається з одиниці алгебри 1 і елементів $I, J, K$, для яких виконуються наступні правила множення:

$$I^2 = J^2 = K^2 = -1,\ IJ = -JI = K,\ JK = -KJ = I,\ KI = -IK = J.$$

Розглянемо в алгебрі $\mathbb{H}(\mathbb{C})$ інший базис $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, розклад елементів якого в базисі $\{1, I, J, K\}$ має вигляд

$$e_1 = \frac{1}{2}(1 + iI), \quad e_2 = \frac{1}{2}(1 - iI), \quad e_3 = \frac{1}{2}(iJ - K), \quad e_4 = \frac{1}{2}(iJ + K),$$

де $i$ — уявна комплексна одиниця. Таблиця множення в новому базисі набуває вигляду

| $\cdot$ | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | $e_4$ |
|---|---|---|---|---|
| $e_1$ | $e_1$ | $0$ | $e_3$ | $0$ |
| $e_2$ | $0$ | $e_2$ | $0$ | $e_4$ |
| $e_3$ | $0$ | $e_3$ | $0$ | $e_1$ |
| $e_4$ | $e_4$ | $0$ | $e_2$ | $0$ |

.

Норма кватерніона $c = \sum\limits_{k=1}^{4} c_k e_k$, $c_k \in \mathbb{C}$ визначається рівністю

$$\|c\| := \sqrt{\sum_{k=1}^{4} |c_k|^2}\,, \tag{1}$$

а одиниця алгебри $\mathbb{H}(\mathbb{C})$ в цьому базисі є сумою ідемпотентів: $1 = e_1 + e_2$.

Розглянемо лінійні функціонали $f_1\colon \mathbb{H}(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}$ та $f_2\colon \mathbb{H}(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}$, покладаючи

$$f_1(e_1) = f_1(e_3) = 1, \qquad f_1(e_2) = f_1(e_4) = 0,$$

$$f_2(e_2) = f_2(e_4) = 1, \qquad f_2(e_1) = f_2(e_3) = 0.$$

Нехай

$$i_1 = 1, \qquad i_2 = a_1e_1 + a_2e_2, \qquad i_3 = b_1e_1 + b_2e_2$$

при $a_k, b_k \in \mathbb{C},\ k = 1, 2$ — трійка лінійно незалежних векторів над полем дійсних чисел $\mathbb{R}$ (див. [1, с. 223]). Це означає, що рівність

$$\alpha_1 i_1 + \alpha_2 i_2 + \alpha_3 i_3 = 0, \qquad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$$

виконується тоді і тільки тоді, коли $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

Виділимо в алгебрі $\mathbb{H}(\mathbb{C})$ лінійну оболонку $E_3\colon = \{\zeta = xi_1 + yi_2 + zi_3\colon x, y, z \in \mathbb{R}\}$ над полем дійсних чисел $\mathbb{R}$, породжену векторами $i_1, i_2, i_3$. Області $\Omega$ тривимірного простору $\mathbb{R}^3$ поставимо у відповідність область $\Omega_\zeta\colon = \{\zeta = xi_1 + yi_2 + zi_3 : (x, y, z) \in \Omega\}$ в $E_3$.

Введемо позначення $\xi_1\colon = f_1(\zeta) = x + ya_1 + zb_1$, $\xi_2\colon = f_2(\zeta) = x + ya_2 + zb_2$. Тепер елемент $\zeta \in E_3$ можна подати у вигляді $\zeta = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2$, і згідно визначення (1)

$$\|\zeta\| = \sqrt{|\xi_1|^2 + |\xi_2|^2}. \tag{2}$$

Позначимо через $f_k(E_3)\colon = \{f_k(\zeta) : \zeta \in E_3\}$, $k = 1, 2$. Відмітимо, що в подальшому істотним є припущення: $f_1(E_3) = f_2(E_3) = \mathbb{C}$. Очевидно, що воно має місце тоді і тільки тоді, коли хоча б одне з чисел у кожній з пар $(a_1, b_1)$, $(a_2, b_2)$ належить $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Неперервне відображення $\Phi : \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ $\big($або $\widehat{\Phi} : \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})\big)$ називається *право-$G$-моногенним* $\big($або *ліво-$G$-моногенним*$\big)$ в області $\Omega_\zeta \subset E_3$, якщо $\Phi$ $\big($або $\widehat{\Phi}\big)$ диференційовне за Гато у кожній точці цієї області, тобто якщо для кожного $\zeta \in \Omega_\zeta$ існує елемент $\Phi'(\zeta)$ $\big($або $\widehat{\Phi}'(\zeta)\big)$ алгебри $\mathbb{H}(\mathbb{C})$ такий, що виконується рівність

$$\lim_{\varepsilon \to 0+0} \Big(\Phi(\zeta + \varepsilon h) - \Phi(\zeta)\Big)\varepsilon^{-1} = h\Phi'(\zeta) \quad \forall\, h \in E_3$$

$$\left(\text{або } \lim_{\varepsilon\to 0+0}\left(\widehat{\Phi}(\zeta+\varepsilon h)-\widehat{\Phi}(\zeta)\right)\varepsilon^{-1}=\widehat{\Phi}'(\zeta)h \quad \forall\, h\in E_3\right).$$

Із розкладу резольвенти (див. [6])

$$(t-\zeta)^{-1}=\frac{1}{t-\xi_1}\,e_1+\frac{1}{t-\xi_2}\,e_2\,, \qquad \forall\; t\in\mathbb{C}:\; t\neq\xi_1\,,\; t\neq\xi_2$$

випливає, що точки $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$, які відповідають необоротним елементам $\zeta=xi_1+yi_2+zi_3\in E_3$, лежать на прямих

$$L^1\colon x+y\,\mathrm{Re}\;a_1+z\,\mathrm{Re}\;b_1=0, \qquad y\,\mathrm{Im}\;a_1+z\,\mathrm{Im}\;b_1=0,$$

$$L^2\colon x+y\,\mathrm{Re}\;a_2+z\,\mathrm{Re}\;b_2=0, \qquad y\,\mathrm{Im}\;a_2+z\,\mathrm{Im}\;b_2=0$$

в просторі $\mathbb{R}^3$. Прямим $L^1$, $L^2$ поставимо у відповідність конгруентні їм прямі $L^1_\zeta\,,\; L^2_\zeta$ в $E_3$.

В роботах [2] — [4] для різних класів функцій кватерніонної змінної встановлено аналоги класичних результатів комплексного аналізу, зокрема, доведено аналоги інтегральних теорем Коші, інтегральної формули Коші, теореми Морера та досліджено розклади в степеневі ряди і ряди Лорана.

В роботі [5] для $G$-моногенних відображень отримано аналоги інтегральної теореми Коші для криволінійного і поверхневого інтегралів та аналог інтегральної формули Коші.

В цій роботі отримано розклади $G$-моногенних відображень в ряди Тейлора і Лорана, а також здійснено класифікацію особливих точок згаданих відображень.

**2. Степеневі ряди і $G$-моногенні відображення.** Безпосереднє застосування способу розкладу голоморфних функцій, що базується на розкладі в ряд ядра Коші (див., наприклад, [7, с. 107]), до право-$G$-моногенного в області $\Omega_\zeta$ відображення $\Phi\colon\Omega_\zeta\longrightarrow\mathbb{H}(\mathbb{C})$, дозволяє отримати його розклад в степеневий ряд

$$\Phi(\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty}(\zeta-\zeta_0)^n p_n \tag{3}$$

в кулі з центром у фіксованій точці $\zeta_0 \in \Omega_\zeta$ меншого радіуса, ніж відстань від точки $\zeta_0$ до межі $\partial\Omega_\zeta$; тут

$$p_n = \frac{\Phi^{(n)}(\zeta_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_\zeta} \Big((\tau-\zeta_0)^{-1}\Big)^{n+1} d\tau \Phi(\tau)\,, \quad n = 0, 1, \ldots,$$

а $\gamma_\zeta$ визначена в роботі [5]. Це пов'язано з тим, що в нерівності $\|ab\| \leq 2\sqrt{2}\,\|a\|\|b\|$ константа $2\sqrt{2}$ не може бути замінена одиницею.

Проте, використовуючи представлення право-$G$-моногенного відображення $\Phi\colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ через аналітичні функції комплексної змінної, покажемо, що право-$G$-моногенне відображення $\Phi$ в кулі $B(\zeta_0, R)\colon = \{\zeta \in E_3 : \|\zeta - \zeta_0\| < R\}$ радіуса $R\colon = \min\limits_{\zeta\in\partial\Omega_\zeta} \|\zeta - \zeta_0\|$ з центром в довільній точці $\zeta_0 \in \Omega_\zeta$ подається у вигляді ряду (3).

Розглядаючи питання про розклад $G$-моногенних відображень $\Phi\colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ і $\widehat{\Phi}\colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ в степеневий ряд, без обмеження загальності будемо вважати, що область $\Omega_\zeta \subset E_3$ є обмеженою.

Нехай $\zeta_0\colon = x_0 i_1 + y_0 i_2 + z_0 i_3$ — довільна фіксована точка області $\Omega_\zeta$ і $R_0\colon = \min\limits_{\zeta\in\partial\Omega_\zeta} \|\zeta - \zeta_0\|$, де через $\partial\Omega_\zeta$ позначено межу області $\Omega_\zeta$ в $E_3$. Візьмемо кулю $\Theta(\zeta_0, R_0)\colon = \{\zeta \in E_3\colon \|\zeta - \zeta_0\| < R_0\}$ в $E_3$ радіуса $R_0$ з центром в точці $\zeta_0$.

Позначимо через $\xi_{10}\colon = x_0 + a_1 y_0 + b_1 z_0$ і $\xi_{20}\colon = x_0 + a_2 y_0 + b_2 z_0$ точки комплексної площини, які відповідають точці $\zeta_0$ за формулами $\xi_{10} = f_1(\zeta_0)$ і $\xi_{20} = f_2(\zeta_0)$, а через $\widetilde{D}_1$ і $\widetilde{D}_2$ — області в $\mathbb{C}$, на які куля $\Theta(\zeta_0, R_0)$ відображається відповідно функціоналами $f_1$ і $f_2$.

Нехай $R\colon = \min\Big\{R_0\,, \min\limits_{\tau_1\in\partial\widetilde{D}_1} |\tau_1 - \xi_{10}|\,, \min\limits_{\tau_2\in\partial\widetilde{D}_2} |\tau_2 - \xi_{20}|\Big\}$, де через $\partial\widetilde{D}_1$ і $\partial\widetilde{D}_2$ позначено відповідно межі областей $\widetilde{D}_1$ і $\widetilde{D}_2$. Через $U(\xi_{10}, R) := \{\xi_1 \in \mathbb{C}\colon |\xi_1 - \xi_{10}| < R\}$ і $U(\xi_{20}, R) := \{\xi_2 \in \mathbb{C}\colon |\xi_2 - \xi_{20}| < R\}$ позначимо круги радіуса $R$ в комплексній площині з центрами відповідно в точках $\xi_{10}$ і $\xi_{20}$.

Покажемо, що представлення (див. [6])

$$\Phi(\zeta) = F_1(\xi_1)e_1 + F_2(\xi_2)e_2 + F_3(\xi_1)e_3 + F_4(\xi_2)e_4, \tag{4}$$

де $F_1$ і $F_3$ — деякі голоморфні в $U(\xi_{10}, R)$ функції, а $F_2$ і $F_4$ — деякі голоморфні в $U(\xi_{20}, R)$ функції, дозволяє отримати розклад право-$G$-моногенного відображення в степеневий ряд

$$\Phi(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} (\zeta - \zeta_0)^n p_n \tag{5}$$

в області $B(\zeta_0, R) := \{\zeta \in E_3 \colon f_1(\zeta) \in U(\xi_{10}, R)\,, f_2(\zeta) \in U(\xi_{20}, R)\}$, а представлення

$$\widehat{\Phi}(\zeta) = F_1(\xi_1)e_1 + F_2(\xi_2)e_2 + F_3(\xi_2)e_3 + F_4(\xi_1)e_4\,, \tag{6}$$

де $F_1$ і $F_4$ — деякі голоморфні в $U(\xi_{10}, R)$ функції, а $F_2$ і $F_3$ — деякі голоморфні в $U(\xi_{20}, R)$ функції, дозволяє отримати розклад ліво-$G$-моногенного відображення в степеневий ряд

$$\widehat{\Phi}(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{p}_n (\zeta - \zeta_0)^n \tag{7}$$

в області $B(\zeta_0, R)$.

Оскільки за побудовою область $B(\zeta_0, R)$ є опуклою в напрямку прямих $L_\zeta^1$ і $L_\zeta^2$, то в ній право-$G$-моногенне відображення $\Phi(\zeta)$ подається у вигляді (4), а ліво-$G$-моногенне відображення $\widehat{\Phi}(\zeta)$ подається у вигляді (6).

**Теорема 1.** *Нехай $f_1(E_3) = f_2(E_3) = \mathbb{C}$, відображення $\Phi \colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ — право-$G$-моногенне, а $\widehat{\Phi} \colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ — ліво-$G$-моногенне в довільній обмеженій області $\Omega_\zeta \subset E_3$ і $\zeta_0 \in \Omega_\zeta$. Тоді в області $B(\zeta_0, R)$ відображення $\Phi$ подається у вигляді суми абсолютно збіжного степеневого ряду* (5), *в якому*

$$p_n = a_n e_1 + b_n e_2 + c_n e_3 + d_n e_4\,, \tag{8}$$

*і $a_n\,, b_n\,, c_n\,, d_n$ — коефіцієнти рядів Тейлора функцій*

$$\begin{aligned} F_1(\xi_1) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (\xi_1 - \xi_{10})^n, \qquad & F_2(\xi_2) &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n (\xi_2 - \xi_{20})^n, \\ F_3(\xi_1) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (\xi_1 - \xi_{10})^n, \qquad & F_4(\xi_2) &= \sum_{n=0}^{\infty} d_n (\xi_2 - \xi_{20})^n, \end{aligned} \tag{9}$$

*які містяться у представленні* (4) *відображення* $\Phi(\zeta)$ *при* $\zeta \in B(\zeta_0, R)$, *а* $\widehat{\Phi}$ *подається у вигляді суми абсолютно збіжного степеневого ряду* (7), *в якому*

$$\widehat{p}_n = \widehat{a}_n e_1 + \widehat{b}_n e_2 + \widehat{c}_n e_3 + \widehat{d}_n e_4 \tag{10}$$

*і* $\widehat{a}_n$ , $\widehat{b}_n$ , $\widehat{c}_n$ , $\widehat{d}_n$ *— коефіцієнти рядів Тейлора функцій*

$$\begin{aligned}
\widehat{F}_1(\xi_1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{a}_n(\xi_1 - \xi_{10})^n, \qquad \widehat{F}_2(\xi_2) = \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{b}_n(\xi_2 - \xi_{20})^n, \\
\widehat{F}_3(\xi_2) &= \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{c}_n(\xi_2 - \xi_{20})^n, \qquad \widehat{F}_4(\xi_1) = \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{d}_n(\xi_1 - \xi_{10})^n,
\end{aligned} \tag{11}$$

*які містяться у представленні* (6) *відображення* $\widehat{\Phi}(\zeta)$ *при* $\zeta \in B(\zeta_0, R)$.

***Доведення.*** Оскільки у представленні (4) функції $F_1, F_3$ голоморфні в крузі $U(\xi_{10}, R)$, а функції $F_2$, $F_4$ голоморфні в крузі $U(\xi_{20}, R)$, то у відповідних кругах ряди (9) абсолютно збіжні. Тоді при всіх $\zeta \in B(\zeta_0, R)$ рівність (4) набуває вигляду

$$\Phi(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(\xi_1 - \xi_{10})^n e_1 + \sum_{n=0}^{\infty} b_n(\xi_2 - \xi_{20})^n e_2 +$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} c_n(\xi_1 - \xi_{10})^n e_3 + \sum_{n=0}^{\infty} d_n(\xi_2 - \xi_{20})^n e_4.$$

Звідси, враховуючи співвідношення

$$\begin{aligned}
(\zeta - \zeta_0)^n e_1 &= (\xi_1 - \xi_{10})^n e_1, \quad (\zeta - \zeta_0)^n e_2 = (\xi_2 - \xi_{20})^n e_2, \\
(\zeta - \zeta_0)^n e_3 &= (\xi_1 - \xi_{10})^n e_3, \quad (\zeta - \zeta_0)^n e_4 = (\xi_2 - \xi_{20})^n e_4
\end{aligned} \tag{12}$$

для всіх $\zeta \in E_3$ і $n = 0, 1, \ldots$, приходимо до розкладу (5), коефіцієнти якого визначаються рівністю (8), при цьому ряд (5) абсолютно збігається в області $B(\zeta_0, R)$. Повністю аналогічно доводиться рівність (7). Теорему доведено.

Тепер так, як і для голоморфних функцій комплексної змінної (див., наприклад, [7, с. 118]), встановлюється наступна теорема єдиності для $G$-моногенних відображень, які визначені в області $\Omega_\zeta \subset E_3$ і приймають значення в алгебрі $\mathbb{H}(\mathbb{C})$.

**Теорема 2.** *Якщо два право-$G$-моногенні відображення* $\Phi_1\colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$, $\Phi_2\colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ *в довільній області* $\Omega_\zeta \subset E_3$ *співпадають в деякому околі довільної внутрішньої точки області* $\Omega_\zeta$, *то вони тотожно рівні у всій області* $\Omega_\zeta$.

Аналогічна теорема справедлива і для ліво-$G$-моногенних відображень.

Зазначимо, що співпадання відображень $\Phi_1\colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ і $\Phi_2\colon \Omega_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ на множині точок, яка містить хоча б одну граничну точку області $\Omega_\zeta$, є недостатнім для тотожної рівності цих відображень у всій області $\Omega_\zeta$. Так, наприклад, значення $G$-моногенних в $E_3$ відображень $\Phi_1(\zeta) = \zeta e_3$ і $\Phi_2(\zeta) = 0$ співпадають для всіх $\zeta \in L_\zeta^1$, проте не співпадають тотожно.

**3. Ряди Лорана і класифікація особливих точок $G$-моногенних відображень.** Розглянемо питання про розклад право-$G$-моногенного відображення $\Phi\colon \mathcal{K}_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ і ліво-$G$-моногенного відображення $\widehat{\Phi}\colon \mathcal{K}_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ в ряд Лорана відносно точки $\zeta_0\colon = x_0 i_1 + y_0 i_2 + z_0 i_3$, вважаючи, що відображення задане в необмеженій області

$$\mathcal{K}_\zeta\colon = \{\zeta \in E_3\colon 0 \le r < |\xi_1 - \xi_{10}| < R \le \infty\,, 0 \le r < |\xi_2 - \xi_{20}| < R \le \infty\}\,.$$

**Теорема 3.** *Нехай* $f_1(E_3) = f_2(E_3) = \mathbb{C}$. *Тоді кожне право-$G$-моногенне відображення* $\Phi\colon \mathcal{K}_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ *в області* $\mathcal{K}_\zeta$ *подається в ній у вигляді суми абсолютно збіжного ряду*

$$\Phi(\zeta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\zeta - \zeta_0)^n p_n\,, \tag{13}$$

*де коефіцієнти* $p_n$ *визначаються формулами* (8), *в яких* $a_n, b_n, c_n, d_n$ — *коефіцієнти рядів Лорана функцій*

$$\begin{aligned} F_1(\xi_1) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(\xi_1 - \xi_{10})^n, \qquad & F_2(\xi_2) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n(\xi_2 - \xi_{20})^n, \\ F_3(\xi_1) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(\xi_1 - \xi_{10})^n, \qquad & F_4(\xi_2) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n(\xi_2 - \xi_{20})^n, \end{aligned} \tag{14}$$

*які містяться в розкладі* (4) *відображення* $\Phi(\zeta)$, *а ліво-*$G$*-моногенне відображення* $\widehat{\Phi}:\mathcal{K}_\zeta \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$ *подається в області* $\mathcal{K}_\zeta$ *у вигляді суми абсолютно збіжного ряду*

$$\widehat{\Phi}(\zeta)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\widehat{p}_n(\zeta-\zeta_0)^n\,, \tag{15}$$

*де коефіцієнти* $\widehat{p}_n$ *визначаються формулами* (10), *в яких* $\widehat{a}_n,\widehat{b}_n,\widehat{c}_n,\widehat{d}_n$ — *коефіцієнти рядів Лорана функцій*

$$\begin{aligned}\widehat{F}_1(\xi_1)&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\widehat{a}_n(\xi_1-\xi_{10})^n, \qquad &\widehat{F}_2(\xi_2)&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\widehat{b}_n(\xi_2-\xi_{20})^n,\\ \widehat{F}_3(\xi_2)&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\widehat{c}_n(\xi_2-\xi_{20})^n, \qquad &\widehat{F}_4(\xi_1)&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\widehat{d}_n(\xi_1-\xi_{10})^n,\end{aligned} \tag{16}$$

*які містяться в розкладі* (6) *відображення* $\widehat{\Phi}(\zeta)$ *при* $\zeta\in\mathcal{K}_\zeta$. *При цьому* $(\zeta-\zeta_0)^n$ *при* $n=-1,-2,\ldots$ *в рівностях* (13), (15) *визначається рівністю* $(\zeta-\zeta_0)^n:=\big((\zeta-\zeta_0)^{-1}\big)^{-n}$.

***Доведення.*** Оскільки в поданні (4) функції $F_1$, $F_3$ голоморфні в кільці $\{\xi_1\in\mathbb{C}\colon r<|\xi_1-\xi_{10}|<R\}$, а функції $F_2$, $F_4$ голоморфні в кільці $\{\xi_2\in\mathbb{C}\colon r<|\xi_2-\xi_{20}|<R\}$, то ряди (14) у відповідних кільцях абсолютно збіжні. Використовуючи розклади (14), рівність (4) набуває вигляду

$$\Phi(\zeta)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(\xi_1-\xi_{10})^n e_1+\sum_{n=-\infty}^{\infty}b_n(\xi_2-\xi_{20})^n e_2+$$
$$+\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(\xi_1-\xi_{10})^n e_3+\sum_{n=-\infty}^{\infty}d_n(\xi_2-\xi_{20})^n e_4.$$

Тепер, враховуючи співвідношення (12), які виконуються при всіх цілих значеннях $n$, отримуємо розклад відображення $\Phi$ в абсолютно збіжний в області $\mathcal{K}_\zeta$ ряд (13), коефіцієнти якого визначаються рівностями (8). Повністю аналогічно доводиться розклад у ряд Лорана ліво-$G$-моногенного відображення (6). Теорему доведено.

Сукупність членів ряду Лорана (13) $\big($або (15)$\big)$ з невід'ємними степенями називають його *правильною частиною*, а сукупність членів цього ряду з від'ємними степенями — *головною частиною* ряду Лорана.

Компактифікуємо алгебру $\mathbb{H}(\mathbb{C})$, додаючи до неї нескінченно віддалену точку $\infty$, до якої прямує кожна послідовність $w_n\colon =\tau_{1,n}e_1+\tau_{2,n}e_2+\tau_{3,n}e_3+\tau_{4,n}e_4$, де $\tau_{1,n}$, $\tau_{2,n}$, $\tau_{3,n}$, $\tau_{4,n}\in\mathbb{C}$, у випадку коли хоча б одна з послідовностей $\tau_{1,n}$, $\tau_{2,n}$, $\tau_{3,n}$, $\tau_{4,n}$ збігається до нескінченно віддаленої точки розширеної комплексної площини.

Припустимо тепер, що право-$G$-моногенне відображення $\Phi\colon \mathcal{K}_\zeta^0\longrightarrow\mathbb{H}(\mathbb{C})$ і ліво-$G$-моногенне відображення $\widehat{\Phi}\colon \mathcal{K}_\zeta^0\longrightarrow\mathbb{H}(\mathbb{C})$ задані в області

$$\mathcal{K}_\zeta^0\colon =\{\zeta\in E_3\colon 0<|\xi_1-\xi_{10}|<R\le\infty\,,0<|\xi_2-\xi_{20}|<R\le\infty\}\,.$$

Позначимо через $\widetilde{\mathcal{K}}_\zeta^0\colon =\{\zeta\in E_3:|\xi_1-\xi_{10}|<R\,,|\xi_2-\xi_{20}|<R\}$.

Справедлива наступна теорема.

**Теорема 4.** *Нехай* $f_1(E_3)=f_2(E_3)=\mathbb{C}$. *Якщо розклад* (13) *відображення* $\Phi:\mathcal{K}_\zeta^0\longrightarrow\mathbb{H}(\mathbb{C})$ *:*

1) *не містить головної частини, то відображення* $\Phi$ *має скінченні границі*

$$\lim_{\substack{\zeta\longrightarrow\zeta_0+e^*,\\ \zeta\notin\left\{\zeta_0+e^*\colon\, e^*\in L_\zeta^1\cup L_\zeta^2\right\}}}\Phi(\zeta)\tag{17}$$

2) *містить лише скінченне число доданків у головній частині, то хоча б при одному значенні* $k=1$ *або* $k=2$ *відображення* $\Phi$ *має нескінченні границі*

$$\lim_{\substack{\zeta\longrightarrow\zeta_0+e_k^*,\\ \zeta\notin\left\{\zeta_0+e_k^*\colon\, e_k^*\in L_\zeta^k\right\}}}\Phi(\zeta)\tag{18}$$

*в усіх точках* $\zeta_0+e_k^*\in\widetilde{\mathcal{K}}_\zeta^0\cap\{\zeta_0+e_k^*\colon\; e_k^*\in L_\zeta^k\}$*;*

3) *містить нескінченне число доданків у головній частині, то хоча б при одному значенні* $k=1,2$ *відображення* $\Phi$ *або має нескінченну границю, або не має ні скінченної, ні нескінченної границі в усіх точках* $\zeta_0+e_k^*\in\widetilde{\mathcal{K}}_\zeta^0\cap\{\zeta_0+e_k^*\colon\; e_k^*\in L_\zeta^k\}$.

*Аналогічні твердження справедливі для ліво-$G$-моногенних відображень.*

***Доведення.*** Відображення $\Phi$ в області $\mathcal{K}_\zeta^0$ подається у вигляді (4), де функції $F_1$, $F_3$ голоморфні в проколотому околі $U(\xi_{10}, R) \setminus \{\xi_{10}\}$ точки $\xi_{10}$, а функції $F_2$, $F_4$ голоморфні в проколотому околі $U(\xi_{20}, R) \setminus \{\xi_{20}\}$ точки $\xi_{20}$.

Розглянемо випадок, коли розклад (13) не містить головної частини, тобто має вигляд (5). При цьому коефіцієнти рядів Лорана (14) пов'язані з коефіцієнтами ряду (5) співвідношеннями (8), з яких, в силу рівностей $p_n = 0$ при $n = -1, -2, \ldots$, слідують рівності $a_n = b_n = c_n = d_n = 0$ при всіх від'ємних індексах $n$. Отже, ряди Лорана (14) в околах відповідних точок $\xi_{10}$, $\xi_{20}$ є рядами Тейлора своїх сум і тому функції $F_1$, $F_2$, $F_3$, $F_4$ з рівності (4) є голоморфними у відповідних областях $U(\xi_{10}, R)$ чи $U(\xi_{20}, R)$. Тому відображення (4) має скінченні границі (17) в усіх точках $\zeta_0 + e^* \in \widetilde{\mathcal{K}}_\zeta^0 \cap \left\{\zeta_0 + e^* \colon e^* \in L_\zeta^1 \cup L_\zeta^2\right\}$.

Розглянемо тепер випадок, коли головна частина розкладу (13) містить лише скінченне число доданків, тобто в (13) тільки скінченне число відмінних від нуля коефіцієнтів $p_n$ при від'ємних $n$. Тоді із співвідношень (8), які пов'язують коефіцієнти рядів Лорана (14) з коефіцієнтами ряду (13), випливає, що всі головні частини рядів (14) не містять нескінченної кількості доданків і головна частина хоча б одного з них відмінна від тотожного нуля. Тому точка $\xi_{10}$ не є істотно особливою точкою для функцій $F_1$, $F_3$, а точка $\xi_{20}$ — для функцій $F_2$ і $F_4$, але хоча б одна з функцій $F_1$, $F_2$, $F_3$, $F_4$ має полюс у відповідній точці. Звідси випливає, що хоча б одна з функцій $F_1$, $F_2$, $F_3$, $F_4$ має нескінченну границю при $\xi_1 \to \xi_{10}$ чи при $\xi_2 \to \xi_{20}$, тобто границя (18) є також нескінченною при $k = 1$ або $k = 2$.

Розглянемо, нарешті, випадок, коли головна частина розкладу (13) містить нескінченно багато відмінних від нуля членів, тобто існує нескінченно багато відмінних від нуля коефіцієнтів $p_n$ при відемних $n$. Тоді із співвідношень (8) випливає, що головна частина хоча б одного з рядів (14) містить нескінченно багато доданків, а це, в свою чергу, означає, що або точка $\xi_{10}$ є істотно особливою для функцій $F_1$ чи $F_3$, або точка $\xi_{20}$ є істотно особливою, принаймні, для однієї з функцій: $F_2$ чи $F_4$. Тому відображення $\Phi$ не може мати скінченної границі в усіх точках множини $\widetilde{\mathcal{K}}_{\zeta}^{0}\cap\{\zeta_0+e^*\colon e^*\in L_{\zeta}^{1}\cup L_{\zeta}^{2}\}$, але вона може мати в цих точках нескінченну границю.

Так, наприклад, якщо $\xi_{10}$ — полюс функції $F_1$ і істотно особлива точка функції $F_3$, а $\xi_{20}$ — істотно особлива точка функцій $F_2$, $F_4$, то функція $F_1$ має нескінченну границю в точці $\xi_{10}$, а отже, границя (18) є нескінченною в усіх точках $\zeta_0+e^*\in\widetilde{\mathcal{K}}_{\zeta}^{0}\cap\{\zeta_0+e^*\colon e^*\in L_{\zeta}^{1}\}$.

У випадку, коли, наприклад, $F_2\equiv 0$, $F_3\equiv 0$, $F_4\equiv 0$ і точка $\xi_{10}$ є істотно особливою для функції $F_1$, відображення $\Phi$ не має ні скінченної, ні нескінченної границі (18) в усіх точках $\zeta_0+e^*\in\widetilde{\mathcal{K}}_{\zeta}^{0}\cap\{\zeta_0+e^*\colon e^*\in L_{\zeta}^{1}\}$. Теорему доведено.

Поняття усувної особливої точки, полюса або істотно особливої точки для $G$-моногенного в області $\mathcal{K}_{\zeta}^{0}$ відображення $\Phi\colon\mathcal{K}_{\zeta}^{0}\longrightarrow\mathbb{H}(\mathbb{C})$ вводяться так, як і відповідні поняття для голоморфних функцій в комплексній площині (див., наприклад, [7, с. 135]). А саме, точка $\zeta_0$ називається:

1) *усувною особливою точкою* відображення $\Phi$, якщо існує скінченна границя

$$\lim_{\substack{\zeta\longrightarrow\zeta_0,\\ \zeta\notin\{\zeta_0+e^*\colon e^*\in L_{\zeta}^{1}\cup L_{\zeta}^{2}\}}}\Phi(\zeta)=A;$$

2) *полюсом* функції $\Phi$, якщо існує нескінченна границя

$$\lim_{\substack{\zeta\longrightarrow\zeta_0,\\ \zeta\notin\{\zeta_0+e^*\colon e^*\in L_{\zeta}^{1}\cup L_{\zeta}^{2}\}}}\Phi(\zeta)=\infty;$$

3) *істотно особливою точкою* відображення $\Phi$, якщо відображення $\Phi$ не має ні скінченної, ні нескінченної границі при $\zeta\longrightarrow\zeta_0$ і $\zeta\notin\{\zeta_0+e^*\colon e^*\in L_{\zeta}^{1}\cup L_{\zeta}^{2}\}$.

Повністю аналогічно дані поняття вводяться і для ліво-$G$-моногенних відображень $\widehat{\Phi}\colon \mathcal{K}_\zeta^0 \longrightarrow \mathbb{H}(\mathbb{C})$.

З теореми 4 випливає, що ізольована особлива точка у $G$-моногенного відображення може бути лише усувною, а у випадку, коли відображення має неусувну особливість в точці $\zeta_0$, особливими є всі точки хоча б однієї з множин $\widetilde{\mathcal{K}}_\zeta^0 \cap \{\zeta_0 + e_1^*\colon\ e_1^* \in L_\zeta^1\}$ або $\widetilde{\mathcal{K}}_\zeta^0 \cap \{\zeta_0 + e_2^*\colon\ e_2^* \in L_\zeta^2\}$.

## Література

[1] Plaksa S. A., Pukhtaievych R. P. *Constructive description of monogenic functions in n-dimensional semi-simple algebra* // An. Şt. Univ. Ovidius Constanţa. — 2014. — **22**, No. 1. — P. 221–235.

[2] Moisil G. C., Theodoresco N. *Functions holomorphes dans l'espace* // Mathematica (Cluj). — 1931. — **5**. — P. 142—159.

[3] Sudbery A. *Quaternionic analysis* // Math. Proc. Camb. Phil. Soc. — 1979. — **85**. — P. 199—225.

[4] Gentili G., Stoppato C., Struppa D. *Regular Functions of a Quaternionic Variable* // Springer Monographs in Mathematics. — 2013.

[5] Shpakivskyi V. S., Kuzmenko T. S. *Integral theorems for the quaternionic G-monogenic mappings* // accepted to An. Şt. Univ. Ovidius Constanţa, http://arxiv.org/pdf/1412.5320v1.pdf

[6] Шпаківський В. С., Кузьменко Т. С. *Про один клас кватерніонних відображень* // прийнята до друку в Укр. мат. журн., http://arxiv.org/pdf/1412.5142v1.pdf.

[7] Шабат Б. В. *Введение в комплексный анализ.* — М.: Наука, 1976. — Ч.1. — 320 с.